

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-4-6-80583028

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 58.39.02

60 F.

ABONNEMENT ANNUEL

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 171 (15/80) 29 MAI 1980

VIGNE

MILDIOU et BLACK-ROT

Plusieurs foyers de mildiou ont été découverts dans les Borderies : il s'agit d'attaques primaires situées en général sur les feuilles basses des pousses issues de pépins de raisin. Aucun autre foyer n'a encore été noté dans les autres secteurs du vignoble Charentais, ni dans le Haut-Poitou ou le Loudunais.

Bien que la situation soit saine, nous conseillons cependant un premier traitement généralisé, du fait du stade végétatif (grappes visibles) qui est très sensible aux attaques de mildiou.

Pour la zone du Haut-Poitou, ce traitement visera également le black-rot en choisissant des produits homologués contre cette maladie et en prenant garde que la dose de certains produits doit être augmentée par rapport à la dose nécessaire contre le seul mildiou.

- . captafol (180 g de matière active par hl au lieu de 120) = Difosan, Orthodifolatan
- . dichlofluanide (250 g/hl au lieu de 125) = Euparène
- . folpel (175 g/hl au lieu de 150) = Nombreuses spécialités

OIDIUM

Le temps est favorable aux premières attaques : ajouter un anti-oïdium à la bouillie. Ne pas oublier que si la lutte n'est pas menée de façon précoce, il est très difficile de rétablir la situation au cours de l'été.

TORDEUSES DE LA GRAPPE (Eudémis, Cochylis)

Le premier vol se poursuit. Les toutes premières pontes déposées entre le 10 et le 20 Mai arriveront à éclosion à partir des premiers jours de Juin. L'observation des toiles pourra donc commencer vers la fin de la première décade de Juin pour repérer les vignes attaquées.

PYRALE DE LA VIGNE - CIGARIERS

Ces insectes sont en pleine activité actuellement. Intervenir sans délai en cas de dégâts importants.

CEREALES

ROUILLE JAUNE

On trouve maintenant de très nombreux foyers dans l'ensemble de la Vienne, dans le sud des Deux-Sèvres, et dans toute la Charente-Maritime. La Charente au contraire est très peu touchée. Se reporter à nos précédents bulletins pour le choix des produits (en respectant bien la dose de matière active indiquée). Nous rappelons que le traitement doit être réalisé dès que la maladie est présente dans une parcelle et que le renouvellement est nécessaire 15 jours plus tard dans les parcelles attaquées précocement.

P.14.05

SEPTORIOSE

En raison du caractère orageux des pluies du début Mai, les contaminations ont été très différentes d'un secteur à l'autre. Nous rappelons que les traitements les plus précoces sont les plus efficaces, mais que les interventions ne sont justifiées que lorsque la troisième et surtout la deuxième feuille (proches de l'épi) sont attaquées.

OIDIUM, ROUILLE BRUNE

Les indications de notre précédent bulletin restent valables.

PUCERONS - CECIDOMYIES

C'est en particulier dans les Charentes que ces ravageurs sont signalés. Pour évaluer les risques concernant la cécidomyie, il est indispensable d'observer les parcelles le soir, en cherchant à voir des femelles en position de ponte sur les épis. Pour les seuils de traitement contre les pucerons, se reporter à notre précédent bulletin.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Renouveler le traitement dès que les précipitations totalisent 25 à 30 mm.

Profiter de l'intervention pour associer un anti-oïdium à la bouillie.

CARPOCAPSE

Dans les zones les plus chaudes des Deux-Sèvres (Plaine de Niort) et de Charente-Maritime l'éclosion des premiers oeufs devrait se produire dans les tous premiers jours de Juin. Réaliser un premier traitement dès réception du bulletin dans ces secteurs. Attendre des informations complémentaires pour les zones plus tardives.

En cas de présence de pucerons ou de chenilles, choisir un produit ayant une bonne action contre ces ravageurs.

P/ Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes"

L'Ingénieur en Chef d'Agriculture, Adjoint :

J.Y. PEYRELONGUE

Imprimé à la Station le 29 Mai 1980 - Précédente Note : Bulletin N° 170 du 21.5.80

N° Papier de Presse : 535 AD.